

ДЕНТОКИНД
Dentokind®
Таблетки
Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочтайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Состав

1 таблетка (100 мг) содержит:

активные вещества: Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг;

вспомогательные компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

APPROVED BY SCDMTE JSC

EXPERT/DATA_ Ребасюк 31.05.17

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство,

PPLIC/INT/DATA_ Михайлов 06.06.17

Показания

Для лечения симптомов прорезывания зубов у детей грудного и младшего возраста, включая раздражительность, беспокойство, оталгию (боль в ушах), болезненность десен, легкую лихорадку и мягкий стул.

Противопоказания

Дентокинд не следует применять если у Вашего ребенка известна аллергия (гиперчувствительность) к одному из активных или вспомогательных компонентов данного лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это также касается медикаментов, которые можно приобрести без рецепта.

Особые предостережения и меры предосторожности

Если Вы заметите, что Ваш ребёнок недостаточно отвечает на Дентокинд, или у него появляются непредвиденные симптомы, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Препарат содержит лактозу (молочный сахар). Если Ваш врач сказал Вам, что у Вашего ребёнка известна непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA - Р.С.05/17

APPLICANT/DATA - М.Г. 06.06.17

использовать это лекарственное средство.

При отсутствии улучшения состояния ребенка на фоне применения препарата в течение первых 2 суток и/или повышении температуры тела выше 38° необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда применяйте Дентокинд так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт. Если Вы не уверены в чём-либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети до 3 лет

При острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в день.
После ослабления симптоматики по 1 таблетке 3 раза в день.

Детям от 3 до 6 лет

При острых симптомах по 2 таблетке через каждый час, но не более 12 таблеток в день.
После ослабления симптоматики по 2 таблетки 3 раза в день.

Таблетки принимают внутрь за 30 минут до еды, или через 40 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей и детей до 3 лет таблетки необходимо растворить в небольшом количестве воды (1 чайная ложка).

Длительность лечения до 7 дней. При необходимости возможно повторение курса.

В случае, если Вы пропустили прием лекарства, не давайте ребенку двойную дозу препарата.

Опасность развития вредных эффектов при передозировке или прекращении лечения отсутствуют.

Побочные действия

Как и все прочие лекарственные средства Дентокинд может вызывать побочные явления, но развиваются они не у каждого.

У препарата Дентокинд нет известных побочных действий.

Если Вы заподозrite, что после приёма препарата Дентокинд у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта, проинформируйте об этом Вашего врача или фармацевта.

Примечание. При приёме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить приём препарата и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Срок годности после первого вскрытия флакона: 12 месяцев.

Не применяйте Дентокинд после даты истечения срока годности, указанной на



картонной коробке и на флаконе.

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и её содержимое

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель и владелец регистрационного удостоверения

ДХУ

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арштамиттель ГмбХ & Ко, КГ,

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

APPROVED BY SCDMTE JSC

EXPERT/DATA_ *P. lastov* 31.05.17

APPLICANT/DATA_ *fudgjew* 06.06.17