

ЭНТЕРОКИНД
Enterokind®

Капли для приема внутрь, раствор.
Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочтайте листок-вкладыши, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыши, может быть Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Состав:

1 г раствора содержит: Chamomilla D6 0,1 г, Cina D6 0,1 г, Colocynthis D6 0,1 г, Lac defloratum D6 0,1 г, Magnesium chloratum D6 0,1 г;
вспомогательные вещества: глицерин 85%, вода очищенная, ксилит.

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь, раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

APPROVED BY COMITE JSL
EXPERTS OF THE 31.05.17
APPROVED BY THE 06.06.17

Показания

Для лечения «детской» колики и метеоризма.

Противопоказания

Энтерокинд не следует применять если у Вашего ребёнка известна аллергия (гиперчувствительность) к одному из активных или вспомогательных компонентов данного лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребёнок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это также касается медикаментов, которые можно приобрести без рецепта.

Особые предостережения и меры предосторожности

Если Вы заметите, что Ваш ребёнок недостаточно отвечает на Энтерокинд, или у него появляются непредвиденные симптомы, пожалуйста, обратитесь к врачу.

В препарате содержится небольшое количество алкоголя (менее 100 мг на дозу).

Режим дозирования и способ применения

Всегда применяйте Энтерокинд так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт. Если Вы не уверены в чём-либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети до 6 лет:

При острых симптомах по 3 капли через каждый час, но не более 6 раз в день;

после ослабления симптоматики по 3 капли 3 раза в день.

Не рекомендуется применять лекарственное средство вместе с едой и напитками. Капли следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, подержав их немного во рту, прежде чем проглотить. При необходимости капли можно смешивать с небольшим количеством воды.

Курс лечения составляет 3-6 дней.

В случае если Вы пропустили прием лекарственного средства, не давайте ребёнку двойную дозу препарата.

Опасность развития вредных эффектов при передозировке или прекращении лечения отсутствуют.

Побочные действия


Как и все прочие лекарственные средства Энтерокинд может вызывать побочные явления, но развиваются они не у каждого.

У препарата Энтерокинд нет известных побочных действий. Если Вы заподозрите, что после приёма препарата Энтерокинд у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта, проинформируйте об этом Вашего врача или фармацевта.

Примечание. При приёме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить приём препарата и проконсультироваться с врачом.

APPROVED BY SCIENTE JSC

EXPERT/ DATA_ Ребоды 31.05.17

APPROVED BY SCIENTE JSC  06.06.17

Срок годности

5 лет.

Не применяйте Энтерокинд после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.

Срок годности после вскрытия флакона: 12 месяцев.

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и её содержимое

Капли для приёма внутрь, раствор в стеклянных флаконах по 20 мл, по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель и владелец регистрационного удостоверения

ДХУ

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

APPROVED BY SCDMTE JSC
EXPERT/DATA - *P. Fazliev* 31.05.14
APPLICANT/DATA - *Mengliw* 06.06.14