

ГАСТРИТОЛ
Капли оральные

Инструкция для пациента.

Внимательно прочтайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если счтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Состав лекарственного средства:

100 мл препарата содержат:

активные вещества: жидкий экстракт травы лапчатки гусиной (*Anserinae herba*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 35 мл, жидкий экстракт из цветков ромашки лекарственной (*Matricariae flos*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 45 % (об/об)) 20 мл, жидкий экстракт из корней солодки (*Liquiritiae radix*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 15 мл, жидкий экстракт из корней дягилля (*Angelicae radix*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл, жидкий экстракт из травы кардобенедикта (*Cnici ben. herba*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл, жидкий экстракт из травы полыни горькой (*Absinthii herba*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (об/об)) 5 мл.

прочие ингредиенты (наполнители): этанол 96 % (об./об.), вода очищенная

Форма выпуска.

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства

Прозрачная коричневая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа.

Средства, применяемые при функциональных расстройствах со стороны пищеварительного тракта.

Код АТС A03A X.

Показания.

Функциональная диспепсия, метеоризм, гастриты, в том числе хронический гиперацидный гастрит, а также в составе комплексного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к какому-либо из ингредиентов препарата, аллергические реакции на компоненты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

До настоящего времени не известны.

Меры предосторожности.

Гастритол содержит 40 об. % этанола.

При приеме препарата в соответствии с инструкцией с каждой дозой (25 капель) принимается 0,4 г спирта, что может представлять риск для здоровья пациентов с

заболеваниями печени, поражением ЦНС, больных на алкоголизм, эпилепсию, беременных женщин и детей. Действие других лекарственных средств может уменьшаться или усиливаться.

Хлопьеобразование или помутнение, наблюдается в жидких формах препаратов, приготовленных на растительной основе, не вызывают отрицательных эффектов и не снижают эффективности данного препарата.

Особые предостережения.

1 капля препарата содержит 0,016 г этанола.

Беременность и кормление грудью.

Ввиду отсутствия достаточного опыта применения в подобных случаях препарат не следует принимать женщинам во время беременности и в период лактации.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием.

Применение препарата в диапазоне терапевтических доз не влияет на управление автотранспортом или работу с другими механизмами.

Дети.

Ввиду отсутствия достаточного опыта применения у детей, препарат не следует применять детям до 18 лет.

Режим дозирования и способ применения.

При отсутствии иных предписаний принимать по 20 – 30 капель, растворенных небольшим количеством жидкости, 3 раза в день во время еды. При тяжелых и острых состояниях принимать по 15 - 25 капель каждые 30 мин - 1 час. Такая же схема лечения используется и при повторном лечении.

Длительность лечения – 3 - 4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить через 2 месяца.

Побочные действия.

В крайне редких случаях у пациентов с очень высокой светочувствительностью кожи могут возникнуть кожные реакции по типу солнечного ожога, развивающиеся под действием интенсивного солнечного излучения.

При индивидуальной непереносимости отдельных компонентов препарата в литературных источниках были описаны аллергические реакции (покраснение кожи, высыпания, зуд), реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота), нарушение водно-электролитного баланса.

Однако данные о таких побочных реакциях при применении препарата Гастритол не поступали.

Срок годности

3 года.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности данного препарата составляет 3 года.

Срок хранения после вскрытия флакона - 3 месяца.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка и содержимое.

По 20 мл, 50 мл, 100 мл во флаконе с капельницей; по 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Категория отпуска.

Отпускается без рецепта.

Производитель.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany