

СОЛИДАГОРЕН
(SOLIDAGOREN®)
Капли оральные

Листок-вкладыш. Информация для больных.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз.

Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Основные физико-химические свойства

Прозрачная жидкость коричневого цвета.

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 10 мл (= 9,5 г) капель содержат 7,9 мл жидкого экстракта (1:1,5 - 2,1) смеси травы золотарника (*Solidaginis herba*), травы лапчатки гусиной (*Anserinae herba*), травы хвоща (*Equiseti Herba*) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);

вспомогательные вещества: вода очищенная, этанол 96%.

Форма выпуска.

Капли оральные.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии.

Код АТС G04BP50

Показания.

Основная (базисная) терапия, а также как компонент комплексной терапии при острых и хронических инфекциях мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит).

Хронические неинфекционные заболевания почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит).

Профилактика образования мочевых камней, в том числе и после их удаления.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата. Не следует применять препарат Солидагорен в случае аллергии на растения семейства Астровые (*Asteraceae*), поскольку растения указанного семейства используются при производстве растительного экстракта, который входит в состав препарата.

Из-за содержания в составе Солидагорена экстракта хвоща (*Equisetum arvense*) применение в период беременности данного лекарственного средства противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов.

Меры предосторожности.

Не следует применять препарат для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста.

При наличии крови в моче, высокой температуры тела или при сохранении симптоматики более 5 дней, рекомендовано обратиться к врачу.

Препарат содержит 45% об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Из-за содержания в составе Солидагорена экстракта хвоща (*Equisetum arvense*) применение в период беременности данного лекарственного средства противопоказано.

В период кормления грудью Солидагорен можно применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для ребенка.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием.

Не влияет при соблюдении рекомендованных доз.

Дети.

Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.

Режим дозирования и способ применения.

Взрослым и детям старше 12 лет:

20 - 30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Длительность применения определяется врачом индивидуально.

Побочные действия.

Очень редко: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

Частота неизвестна: легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить. В случае появления побочных эффектов не указанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Срок хранения после вскрытия флакона 3 месяца.

Не применяйте Солидагорен после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности данного препарата составляет 3 года.

Срок хранения после вскрытия флакона - 3 месяца.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка и содержимое.

Капли оральные. По 20 мл, 50 мл или 100 мл капель во флаконе с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону вместе с листком-вкладышем упаковывают в картонную коробку.

Категория отпуска.

Отпускается без рецепта.

Производитель.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия /

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для специалистов)

СОЛИДАГОРЕН
(SOLIDAGOREN®)

Основные физико-химические свойства

Прозрачная жидкость коричневого цвета.

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 10 мл (= 9,5 г) капль содержат 7,9 мл жидкого экстракта (1:1,5 - 2,1) смеси травы золотарника (*Solidaginis herba*), травы лапчатки гусиной (*Anserinae herba*), травы хвоща (*Equiseti Herba*) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);

вспомогательные вещества: вода очищенная, этанол 96%.

Лекарственная форма.

Капли оральные.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии.

Код АТС G04BP50

Фармакологические свойства

Фармакодинамика:

Традиционное растительное лекарственное средство.

Отдельные фармакодинамические исследования на препарат не проводились.

Фармакокинетика:

Отдельные фармакокинетические исследования на препарат Солидагорен не проводились.

Показания.

Основная (базисная) терапия, а также как компонент комплексной терапии при острых и хронических инфекциях мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит).

Хронические неинфекционные заболевания почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит).

Профилактика образования мочевых камней, в том числе и после их удаления.

Дети.

Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.

Режим дозирования и способ применения.

Взрослым и детям старше 12 лет:

20 - 30 капль Солидагорена 3 раза в день. 30 капль соответствует 1,4 мл.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Длительность применения определяется врачом индивидуально.

Побочные действия.

Очень редко: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

Частота неизвестна: легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить. В случае появления побочных эффектов не указанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата. Не следует применять препарат Солидагорен в случае аллергии на растения семейства Астровые (Asteraceae), поскольку растения указанного семейства используются при производстве растительного экстракта, который входит в состав препарата.

Из-за содержания в составе Солидагорена экстракта хвоща (*Equisetum arvense*) применение в период беременности данного лекарственного средства противопоказано.

Передозировка.

О случаях передозировки не сообщалось. В случае передозировки - лечение симптоматическое.

Меры предосторожности.

Не следует применять препарат для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста.

При наличии крови в моче, высокой температуры тела или при сохранении симптоматики более 5 дней, рекомендовано обратиться к врачу.

Препарат содержит 45% об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Из-за содержания в составе Солидагорена экстракта хвоща (*Equisetum arvense*) применение в период беременности данного лекарственного средства противопоказано.

В период кормления грудью Солидагорен можно применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для ребенка.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием.

Не влияет при соблюдении рекомендованных доз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов.

Условия хранения и срок годности.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности данного препарата составляет 3 года.

Срок хранения после вскрытия флакона - 3 месяца.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Категория отпуска.

Отпускается без рецепта.

Форма выпуска и упаковка

Капли оральные. По 20 мл, 50 мл или 100 мл капель во флаконе с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышечкой. По 1 флакону вместе с листком-вкладышем упаковывают в картонную коробку.

Производитель.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия /

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany