

ТЕБОКАН ФОРТЕ
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Листок-вкладыш. Информация для больных.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Основные физико-химические свойства

Гладкие, круглые красные таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

активные вещества: Сухой экстракт из листьев гinkго билоба (35 – 67:1) (EGb 761[®]) – 120 мг.

В экстракте содержится 26,4 – 32,4 мг флавоноидов, в перерасчете на флавон-гликозиды; 6,0 – 8,4 мг терпен-лактонов, из них 3,36 – 4,08 мг гinkголидов А, В, С; 3,12 – 3,84 мг билобалида; а также менее 0,6 мкг гinkголовой кислоты в одной таблетке, покрытой пленочной оболочкой.

прочие ингредиенты (наполнители): моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния безводный, кроскармеллоза натрия, стеарат магния, гипромеллоза 5 мПа, макрогол 1500, оксид железа желтый Е 172, диоксид титана Е 171, тальк, антиперенная эмульсия SE2 (син. WACKER SILFOAM[®] SE2 (диметикон, высокодисперсная двуокись кремния, α-октадецил-ω-гидроксиполи (оксиэтилен) - 5 (син. полиэтиленглиоля и стеарилового спирта эфир), сорбиновая кислота, дистиллированная вода.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа.

АТС-код: N06DX02.

Прочие средства для лечения деменции. Гinkго билоба.

Фармакологические свойства

Клинические исследования показали, что экстракт листьев Гinkго билоба повышает устойчивость к гипоксии, способствует улучшению реологических свойств крови и микроциркуляции.

Показания

- Симптоматическое лечение при ослаблении умственных способностей, вызванном органическим повреждением мозга, в комплексе общих терапевтических мероприятий в связи с синдромом деменции, проявляющегося, преимущественно, следующими симптомами: ослабление памяти, невозможность сосредоточиться, депрессивные состояния, головокружения, звон в ушах и головная боль.

К основной целевой группе относятся пациенты, страдающие синдромом деменции, первичной дегенеративной деменцией, деменцией сосудистого генеза, или смешанной ее формой.

И.А.

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe

25.04.2016

До начала применения экстракта Гинкго, следует удостовериться в том, что отмеченные патологические симптомы не вызваны заболеванием, требующим специфического лечения:

- увеличение дистанции, проходимой без боли, при окклюзионном поражении периферических артерий стадии II (перемежающаяся хромота), по классификации Фонтеяна, в комплексе общих физиотерапевтических мероприятий, в особенности тренировок в ходьбе.
- головокружения сосудистого и инволюционного происхождения.

Сопутствующая терапия при звоне в ушах сосудистого и инволюционного происхождения.

Противопоказания

Гиперчувствительность к экстракту Гинкго билоба или какому-либо вспомогательному компоненту лекарственного средства.

Беременность, период кормления грудью.

Детский возраст до 18 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендован одновременный прием лекарственного средства Тебокан Форте с лекарственными средствами, уменьшающими свертываемость крови (например, фенпрокумон, варфарин, клопидогрель, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты), так как возможно усиление их действия и развитие кровотечений. Не исключено влияние на эффект лекарственных средств, которые метаболизируются цитохромом P450 3A4, 1A2, 2C19.

В случае одновременного приема других лекарственных средств, в том числе отпускаемых без рецепта врача, необходимо обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Применение лекарственного средства Тебокан Форте не рекомендовано у детей и подростков до 18 лет в связи с отсутствием адекватных данных.

Прием лекарственного средства не рекомендован пациентам с повышенной кровоточивостью (геморрагический диатез), пациентам с риском развития кровотечений, пациентам, принимающим антикоагулянтные средства.

В связи с наличием данных о том, что препараты, содержащие Гинкго, могут увеличить риск развития кровотечения, в качестве меры предосторожности следует прекратить прием лекарственного средства Тебокан Форте перед хирургической операцией.

У пациентов с эпилепсией прием препаратов Гинкго может спровоцировать развитие судорожного приступа в связи с содержанием 4-O-метилпиридоксина. Пациентам с эпилепсией перед приемом лекарственного средства необходимо обратиться к врачу.

В связи с содержанием лактозы пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать лекарственное средство Тебокан Форте.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с наличием данных о том, что прием препаратов Гинкго может увеличить риск кровотечения, лекарственное средство Тебокан Форте не должно использоваться во время беременности.

Информация о проникновении компонентов лекарственного средства в грудное молоко отсутствует. Лекарственное средство не следует принимать во время кормления грудью в связи с отсутствием адекватных данных.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами


Информация о влиянии на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами отсутствует.

Способ применения и дозы

Синдром деменции:

25.04.2016

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe



Взрослым старше 18 лет – по 1 таблетке, покрытой оболочкой, 2 раза в день (утром и вечером). Продолжительность лечения должна составлять не менее 8 недель. Если симптомы заболевания не ослабевают или наступает ухудшение после 3-х месяцев терапии, необходимо проконсультироваться с врачом о целесообразности дальнейшего лечения.

Окклюзивное заболевание периферических артерий, головокружение, сопутствующая терапия при звоне в ушах:

Взрослым старше 18 лет – по 1 таблетке, покрытой оболочкой, 1-2 раза в день (утром и вечером). Для достижения увеличения дистанции без боли лечение должно составлять не менее 6 недель. Применение более 6 – 8 недель не принесет дальнейшего улучшения.

Поддерживающая терапия должна проводиться в течение не менее 12 недель. Если через 6 месяцев не наблюдается успешного результата, вряд ли следует ожидать дальнейшего улучшения после более длительного курса лечения.

Дети и подростки

Применение препарата Тебокан форте, не рекомендовано в терапии детей и подростков младше 18 лет.

Для приема внутрь.

Не следует принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в положении лежа. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, следует принимать, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (предпочтительно, стаканом воды). Прием препарата не зависит от приема пищи.

Побочные действия

Частота развития побочных реакций на основании имеющихся данных не определена.

Получены сообщения о развитии аллергических реакций (гиперемия и отек кожи, зуд, анафилактический шок), желудочно-кишечных расстройств, головной боли, головокружения, а также усиления существующего головокружения.

Возможно снижение свертываемости крови и развитие кровотечений (в том числе внутримозговых кровоизлияний), особенно при одновременном приеме с лекарственными средствами, уменьшающими свертываемость крови (например, варфарин, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и её содержимое

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Блистеры по 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. По 1 или 3 блистера в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ

Вильмар-Швабе-Штрассе 4, 76227 Карлсруэ, Германия.

R. A. 
25.04.2016 Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe