

i.A

22.04.2016

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe

ТЕБОКАН
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если счтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Основные физико-химические свойства

Желтые, гладкие, круглые таблетки, покрыты пленочной оболочкой.

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

активные вещества: Сухой экстракт из листьев гinkgo билоба (35 – 67:1) (EGb 761®) – 40 мг, стандартизованный до 8,8 – 10,8 мг флавоноидов, в перерасчете на флавон-гликозиды: 2,0 – 2,8 мг терпен-лактонов, из них 1,12 – 1,36 мг гinkголидов А, В, С; 1,04 – 1,28 мг билобалида; а также менее 0,2 мкг гinkголевой кислоты в одной таблетке, покрытой оболочкой).

прочие ингредиенты (наполнители): моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния безводный, кроскармеллоза натрия, стеарат магния, гипромеллоза 5 мПа, макрогол 1500, оксид железа желтый Е 172, диоксид титана Е 171, тальк, антиперенная эмульсия SE2 (син. WACKER SILFOAM® SE2 (диметикон, высокодисперсная двуокись кремния, α -октадецил- ω -гидроксиполи (оксиэтилен) - 5 (син. полизиэтиленгликоля и стеарилового спирта эфир), сорбиновая кислота, дистиллированная вода.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Pfleseis

Фармакотерапевтическая группа

ATC- код: N06DX02.

05.04.2016

Прочие средства для лечения деменции. Гinkго билоба.

Фармакологические свойства

Клинические исследования показали, что экстракт листьев Гinkго билоба повышает устойчивость к гипоксии, способствует улучшению реологических свойств крови и микрониркуляции.

Показания

- Симптоматическое лечение в составе комплексной терапии когнитивных нарушений легкой и умеренной степени тяжести, вызванных органическим поражением головного мозга. До назначения лекарственного средства следует удостовериться в том, что когнитивные нарушения не вызваны заболеванием, требующим специфического лечения;
- симптоматическое лечение синдрома перемежающейся хромоты при хроническом облитерирующем эндартериите (II стадия классификации по Фонтеину);
- в комплексном лечении головокружения сосудистого и инволюционного происхождения;
- в комплексном лечении шума в ушах сосудистого и инволюционного происхождения.

1.04.2016

22.04.2016

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe

В случае часто повторяющихся приступов головокружения и шума в ушах следует обратиться к врачу. В случае внезапного снижения слуха или утраты слуха за консультацией к врачу следует обратиться незамедлительно.

Противопоказания

Гиперчувствительность к экстракту Гинкго билоба или какому-либо вспомогательному компоненту лекарственного средства.

Беременность, период кормления грудью.

Детский возраст до 18 лет.

Острое нарушение мозгового кровообращения.

Острый инфаркт миокарда.

Declaro,

05.04.2016

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Не рекомендован одновременный прием лекарственного средства Тебокан с лекарственными средствами, уменьшающими свертываемость крови (например, фенпрокумон, варфарин, клопидогрель, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты), так как возможно усиление их действия и развитие кровотечений.

Не исключено влияние на эффект лекарственных средств, которые метаболизируются цитохромом Р450 3A4, 1A2, 2C19.

В случае одновременного приема других лекарственных средств, в том числе отпускаемых без рецепта врача, необходимо обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Применение лекарственного средства Тебокан не рекомендовано у детей и подростков до 18 лет в связи с отсутствием адекватных данных. Прием лекарственного средства не рекомендован пациентам с повышенной кровоточивостью (геморрагический диатез), пациентам с риском развития кровотечений, пациентам, принимающим антикоагулянтные средства.

В связи с наличием данных о том, что препараты, содержащие Гинкго, могут увеличить риск развития кровотечения, в качестве меры предосторожности следует прекратить прием лекарственного средства Тебокан перед хирургической операцией.

У пациентов с эпилепсией прием препаратов Гинкго может спровоцировать развитие судорожного приступа в связи с содержанием 4-О-метилпиридоксина. Пациентам с эпилепсией перед приемом лекарственного средства необходимо обратиться к врачу. В связи с содержанием лактозы пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать лекарственное средство Тебокан.

Способ применения и дозы

Симптоматическое лечение когнитивных нарушений:

Взрослым старше 18 лет – по 1 – 2 таблетки, покрытых пленочной оболочкой, 3 раза в день (утром, днем и вечером).

Симптоматическое лечение хронического облитерирующего эндартериита, головокружения и шума в ушах:

Взрослые старше 18 лет - принимать 3 раза в день по 1 таблетке (утром, днем и вечером) или 2 раза в день по 2 таблетки (утром и вечером).

Дети и подростки

Применение лекарственного средства Тебокан не рекомендовано у детей и подростков до 18 лет.

22.04.2016 /A
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe

Регистр

05.04.2016

Продолжительность приема лекарственного средства

Симптоматическое лечение когнитивных нарушений: прием лекарственного средства рекомендован в течение не менее 8 недель. Если через 3 месяца приема лекарственного средства улучшения состояния не произошло, необходима консультация врача для пересмотра лечения.

Симптоматическое лечение хронического облитерирующего эндартериита: прием лекарственного средства рекомендован в течение не менее 6 недель.

Симптоматическое лечение головокружения: прием лекарственного средства рекомендован в течение 6-8 недель. Более длительный прием не вызывает значимый терапевтический эффект.

Симптоматическое лечение шума в ушах: прием лекарственного средства рекомендован в течение не менее 12 недель. Если после 6 месяцев улучшения не произошло, дальнейший прием лекарственного средства не рекомендован.

Для приема внутрь.

Не следует принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в положении лежа. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, следует принимать, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (предпочтительно, стаканом воды). Прием препарата не зависит от приема пищи.

Побочные действия

Частота развития побочных реакций на основании имеющихся данных не определена. Получены сообщения о развитии аллергических реакций (гиперемия и отек кожи, зуд, анафилактический шок), желудочно-кишечных расстройств, головной боли, головокружения, а также усиления существующего головокружения.

Возможно снижение свертываемости крови и развитие кровотечений (в том числе внутримозговых кровоизлияний), особенно при одновременном приеме с лекарственными средствами, уменьшающими свертываемость крови (например, варфарин, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами

Информация о влиянии на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами отсутствует.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с наличием данных о том, что прием препаратов Гинкго может увеличить риск кровотечения, лекарственное средство Тебокан не должно использоваться во время беременности.

Информация о проникновении компонентов лекарственного средства в грудное молоко отсутствует. Лекарственное средство не следует принимать во время кормления грудью в связи с отсутствием адекватных данных.

Срок годности

5 лет.

I. A.

22.04.2016

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и её содержимое

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Блистеры по 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. По 1 или 3 блистера в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ

Вильмар-Швабе-Штрассе 4, 76227 Карлсруэ, Германия.

Petesch

05.09.2016