

ТРАХИСАН®

Таблетки для рассасывания

ТРАХИСАН

таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочтите этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у Вашего фармацевта.

Состав

В 1 таблетке содержится:

действующие вещества:

тироцирин 0,5 мг, лидокаина гидрохлорид 1 мг, хлоргексидина диглюконат, раствор 1 мг;

вспомогательные вещества:

сорбитол (E 420), магния стеарат, мятное масло.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла.

Показания

Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки, такие как стоматиты, гингивиты, парадонтиты, глосситы, тонзиллиты, фарингиты, и другие состояния, сопровождающиеся нарушением глотания. Для профилактики инфекций перед хирургическим вмешательством на участках полости рта и глотки (экстракция зуба, тонзиллэктомия).

Противопоказания

Нельзя назначать при непереносимости фруктозы. Нельзя назначать при известной гиперчувствительности к какому-либо ингредиенту препарата.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известны.

Особые предостережения и особые меры предосторожности

Не рекомендовано применять препарат детям младше 4 лет, поскольку препарат необходимо рассасывать.

По аналогии со всеми прочими фармацевтическими препаратами принимать Трахисан во время беременности и в период лактации можно только после предварительной консультации с врачом.

Режим дозирования и способ употребления

Принимать по 1 таблетке, рассасывая в полости рта каждые 2 часа. Суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет – 8 таблеток; для детей от 4 до 12 лет – 6 таблеток. Как правило, симптомы заболевания исчезают через несколько дней, но для достижения стабильного терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2-3 суток. В случае если за 5 суток применения препарата состояние пациента не улучшается, необходима консультация врача.

Побочные действия

Обычно Трахисан хорошо переносится. Возможно появление кратковременных изменений вкуса, временное онемение языка. При длительном применении в единичных случаях возможно появление незначительной окраски в желтый или светло-коричневый цвет зубов, зубных пломб и протезов или языка, в таких случаях необходимо придерживаться тщательной гигиены полости рта. Окраска исчезает самостоятельно после прекращения приема препарата.

Срок годности

3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранение

Хранить при температуре не выше 25 °C в защищенном от влаги, недоступном для детей месте.

Упаковка и содержимое

Упаковки по 20 таблеток (блестер по 10 таблеток).

Предприятие-производитель

Энгельгард Арцнеймиттель ГмбХ & Ко. КГ.,
Херцбергштрассе 3, 61138

Нидердорфельден, Германия



Stand: 02/16; PB1679701

