



05.08.2016
И.Р.Б.

ТИРОЗУР

Гель для местного применения

Листок-вкладыш.

Информация для пациента

Внимательно прочитайте этот листок - вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у Вашего фармацевта.

Состав

1 г геля содержит:

действующее вещество: 1 мг тиротрицина; вспомогательные вещества: цетилпиридина хлорид, пропиленгликоль, этанол 96 %, карбомер, трометамол, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель для местного применения.

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотики для местного применения.

Показания

Поверхностные раны с незначительным выделением экссудата и наличием суперинфекции, вызванной чувствительными к тиротрицину патогенными микроорганизмами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами

До настоящего времени не известны. Если Вы применяете или применяли в недавнем прошлом другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом лечащему врачу.

Особые предостережения и особые меры предосторожности

Необходимо соблюдать осторожность в случае применения в области вокруг глаз, поскольку это может вызвать ощущение жжения. Гель Тирозур содержит пропиленгликоль, который может стать причиной раздражения кожи.

Не предназначен для интраназального применения; известны сообщения о том, что это может привести к нарушению обоняния.

Как и все лекарственные препараты, гель Тирозур в период беременности и кормления грудью следует применять после консультации с врачом и после объективной оценки соотношения ожидаемого полезного эффекта и возможного риска.

В случае необходимости гель Тирозур можно применять детям любого возраста.

Режим дозирования и способ применения

Наносить гель 2–3 раза в день тонким слоем на пораженные участки кожи. При небольших ранах и воспалениях кожи открытых участков тела закрывать их, обычно, нет необходимости. При больших повреждениях или мокнущих ранах рекомендуется защитный биндаж, который необходимо менять через 1–2 дня.

Продолжительность лечения устанавливается индивидуально. При отсутствии улучшения по истечении недели лечения препаратом следует проконсультироваться с врачом.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции (ощущение жжения).

Срок годности

3 года.

Срок годности после первого вскрытия тубы - 3 месяца.

Не применять после указанной на упаковке даты истечения срока годности.

Хранение

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка и содержимое

По 5 г, 25 г геля в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

Предприятие-производитель

Энгельгард Арцнайmittel GmbH & Co. KG.
Херцбергштрассе, 3, 61138
Нидердорфелден, Германия.



Stand: 07/16;
PB1686801

APPROVED BY SCDMTE/JSC
EXPERT/DATA *[Signature]* 20.09.16
APPLICANT/DATA

21.09.16

[Signature]





05.08.2016
H.P.

APPROVED BY SCDMTE/SC

EXPERT/DATA_ *H. P.* 20.08.16

APPLICANT/DATA_



21.09.16

I. Kötzg

