

ВИТАНГО
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Основные физико-химические свойства

Круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, красного цвета.

Состав лекарственного средства

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

активное вещество: 1таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит сухого экстракта корней Родиолы розовой (*Rhodiolarosea*) (1,5-5:1)(WS®1375)- 200 мг (экстрагент: этанол 60% (м/м));

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармелоза, диоксид кремния коллоидный, магния стеарат, гипромелоза, кислота стеариновая, железа оксид красный (Е 172), титана диоксид (Е 171), противопенная эмульсия: симетикон, метилцеллюлоза, кислота сорбиновая.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующие средства.

Код ATХ - А13А.

Печать производителя
ООО «Фармакомпания «Родиола»
г. Москва
Проверено
Ребров
дата 06.07.2016
дата 11.07.2016

Показания к применению

Применяется в качестве адаптогенного растительного препарата для профилактики и облегчения ментальных и физических симптомов стресса и переутомления (утомляемость, неврастения, вегето-сосудистая дистония, раздражительность, напряженность).

Противопоказания

Гиперчувствительность к экстракту корней Родиолырозовой или какому-либо вспомогательному компоненту лекарственного средства.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Ни о каких взаимодействиях препарата до сих пор не известно.

Особые предостережения и меры предосторожности

Применение лекарственного средства Витанго® не рекомендовано у детей до 12 лет в связи с отсутствием адекватных данных.

Применение лекарственного средства Витанго® не рекомендовано пациентам с нарушением функции печени или почек ввиду недостаточности данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется принимать препарат во время беременности и кормления грудью ввиду недостаточности данных относительно безопасности приема во время беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами

Применение лекарственного средства Витанго® не влияет на способность управлять автотранспортом или работу с другими механизмами.

Режим дозирования и способ применения

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 таблетки в день за 30 минут до приема пищи: одну перед завтраком, вторую перед обедом, запивая стаканом воды.

Побочные действия

Возможны реакции гиперчувствительности, а также гипогликемия.

Срок годности

4 года.

Не применять препарат после окончания срока действия, указанного на упаковке.

Хранение

Препарат не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и ее содержимое

По 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистеры из ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой. По 1 или 2 блистера с листком-вкладышем помещают в картонную коробку.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

Др. Вильмар Швабе ГмбХ& Ко. КГ,
Вильмар-Швабе-Штрассе, 4,
76227 Карлсруэ,
Германия

Ребор-ФС
06.07.2016
11.07.2016