

Листок-вкладыш – информация для пациента

ЦИННАБСИН (CINNABSIN®), таблетки, 250 мг

Cinnabaris trit. D3, Echinacea trit. D1, Hydrastis trit. D3, Kalium bichromicum trit. D3

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Циннабсин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Циннабсин.
3. Применение препарата Циннабсин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Циннабсин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЦИННАБСИН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Циннабсин является гомеопатическим лекарственным средством для лечения острого и хронического риносинусита.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЦИННАБСИН

Не применяйте препарат Циннабсин:

- если у вас повышенная чувствительность к любому из активных веществ или к одному из компонентов препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), или членам семейства сложноцветных;
- детский возраст до 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- отек лица, жар или сильная головная боль;
- острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения;
- возникают дополнительные жалобы.

Препарат не рекомендуется применять при прогрессирующих системных заболеваниях (таких как туберкулез, саркоидоз), системных заболеваниях крови (например, лейкемии и лейкоз), аутоиммунных заболеваниях (например, при воспалительных заболеваниях коллагеновой ткани (коллагенозы), рассеянном склерозе), иммунодефиците (СПИД, ВИЧ-инфекции), при угнетенном состоянии (например, после трансплантации органа или костного мозга, химиотерапия).

После приема лекарств, содержащих эхинацею, наблюдались кожная сыпь, зуд и в редких случаях отек лица, одышка, головокружение и падение артериального давления.

Из-за содержания эхинацеи существует повышенный риск аллергических реакций у пациентов с атопией. Необходимо проконсультироваться с врачом перед применением лекарственного средства.

Использование лекарств, содержащих эхинацею, в единичных случаях связано с возникновением аутоиммунных заболеваний. При длительном применении (более 8 недель) лекарственного средства, содержащего эхинацею, в единичном случае наблюдалось уменьшение количества лейкоцитов.

Дети

Противопоказан детям до 6 лет.

Другие препараты и препарат Циннабсин

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Циннабсин с пищей, напитками, и алкоголем

На действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек, такие как курение и употребление алкоголя.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием этого лекарственного средства.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение Циннабсина не влияет на способность управлять транспортными средствами и работе с механизмами.

Препарат Циннабсин содержит лактозу и пшеничный крахмал

Если ваш врач говорил вам, что у вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать Циннабсин.

Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать этот лекарственный препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому считается безопасным для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не должны принимать этот лекарственный препарат.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИННАБСИН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Взрослые: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке каждый час (максимум до 12 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Применение у детей

Дети в возрасте от 6 до 11 лет: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке каждые два часа (максимум до 6 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте 12 лет и старше: *при острых состояниях* принимают по 1 таблетке в час (максимум до 12 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

При *хронических состояниях* детям и взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуется продолжать лечение от 4 до 6 недель.

Циннабсин не рекомендуется принимать свыше 4 недель, не проконсультировавшись с врачом.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Маленьким детям рекомендуется растворить таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Если вы приняли препарата Циннабсин больше, чем следовало

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

Если вы забыли принять препарат Циннабсин

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Циннабсин

Никаких вредных последствий не ожидается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно другим лекарственным препаратам Циннабсин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Очень редко ($<1/10000$) или с неизвестной частотой (частота не может быть оценена из имеющихся данных):

После приема Циннабсин могут возникнуть реакции гиперчувствительности, например, кожные высыпания и желудочно-кишечные расстройства. В этих случаях прием препарата следует прекратить и принять соответствующие меры лечения.

Если появляется повышенное слюноотделение, дозировка должна быть уменьшена или лечение прекращено.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИННАБСИН

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 таблетка Циннабсин (250 мг) содержит:

Действующим(ими) веществом(ами) является(ются): Cinnabaris trit. D3 25 мг, Echinacea trit. D1 25 мг, Hydrastis trit. D3 25 мг, Kalium bichromicum trit. D3 25 мг;

вспомогательным(и) веществом(ами) является(ются): лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Внешний вид Циннабсин и содержимое упаковки

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

20 таблеток в блистере. 3 блистера с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7835 635530

ansgar.muhle@klein-naturarznei.de

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7243 200 49 10

ra.germany@alpenpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен