

Листок-вкладыш – информация для пациента

ДЕНТОКИНД (DENTOKIND®), таблетки, 100 мг

Belladonna trit. D6, Chamomilla trit. D6, Ferrum phosphoricum trit. D6,
Hepar sulfuris trit. D12, Pulsatilla trit. D6.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Дентокинд и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Дентокинд.
3. Применение препарата Дентокинд.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Дентокинд.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ДЕНТОКИНД И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Дентокинд является гомеопатическим лекарственным средством для лечения симптомов, возникающих при прорезывании зубов, таких как раздражительность, беспокойство, оталгия (боль в ушах), болезненность десен, умеренная лихорадка и жидкий стул у детей грудного и младшего возраста.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ДЕНТОКИНД

Не применяйте препарат Дентокинд:

- *если у вашего ребенка* повышенная чувствительность к любому из активных веществ или к одному из компонентов препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с врачом:

- если ребенок плохо реагирует на препарат;
- если возникают дополнительные жалобы.

Другие препараты и препарат Дентокинд

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или может принимать любые другие лекарственные средства.

Дентокинд с пищей и напитками

Препарат не рекомендуется принимать вместе с едой. Лучше всего принимать таблетки за полчаса до или через пол часа после еды.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат предназначен для детей.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат предназначен для детей.

Препарат Дентокинд содержит лактозу

Если ваш врач говорил, что у вашего ребенка непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат.

Лекарственное средство содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это лекарственное средство.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЕНТОКИНД

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Дети до 1 года: При острых симптомах назначают по 1 таблетке каждый час, максимум до 6 таблеток в день.

При ослаблении симптоматики назначают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте от 1 до 6 лет:

При острых симптомах назначают по 2 таблетки каждый час, максимум до 12 таблеток в день.

При ослаблении симптоматики назначают по 2 таблетки 3 раза в день.

Способ применения

Таблетки следует медленно рассасывать во рту. Для маленьких детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Если вы приняли препарата Дентокинд больше, чем следовало

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

Если вы забыли принять препарат Дентокинд

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Дентокинд

Никаких вредных последствий не ожидается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно другим лекарственным препаратам Дентокинд может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Побочные эффекты не известны.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

Если вы считаете, что у вашего ребенка возникли какие-либо побочные эффекты, поговорите с врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты, не указанные в этой инструкции.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЕНТОКИНД

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 таблетка Дентокинд (100 мг) содержит:

Действующим(ими) веществом(ами) является(ются): Belladonna trit. D6 15 мг, Chamomilla trit. D6 15 мг, Ferrum phosphoricum trit. D6 15 мг, Hepar sulfuris trit. D12 15 мг; Pulsatilla trit. D6 15 мг;

Вспомогательным(и) веществом(ами) является(ются): целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, магния стеарат, тальк.

Внешний вид Дентокинд и содержимое упаковки

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

150 таблеток во флаконе. 1 флакон с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7835 635530

ansgar.muhle@klein-naturarznei.de

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7243 200 49 10

ra.germany@alpenpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен