

Листок-вкладыш – информация для пациента

ИММУНОКИНД (IMMUNOKIND®), таблетки, 100 мг

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, Calcium fluoratum trit. D6, Calcium phosphoricum trit. D6, Sulfur jodatum trit. D12

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Иммунокинд, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Иммунокинд.
3. Применение препарата Иммунокинд
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Иммунокинд.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ИММУНОКИНД И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Иммунокинд является гомеопатическим лекарственным средством для повышения резистентности к рецидивирующим инфекциям верхних дыхательных путей у детей грудного и младшего возраста.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ИММУНОКИНД

Не применяйте препарат Иммунокинд:

- *если у вашего ребенка* повышенная чувствительность к любому из активных веществ или к одному из компонентов препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок страдает заболеванием щитовидной железы, прежде чем начинать лечение препаратом.

Проконсультируйтесь с врачом:

- если ребенок плохо реагирует на препарат;
- если возникают дополнительные жалобы.

Не рекомендуется применять препарат для длительного лечения без консультации с врачом.

Другие препараты и препарат Иммунокинд

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или может принимать любые другие лекарственные средства.

Иммунокинд с пищей и напитками

Препарат не следует принимать вместе с едой. Рекомендуется принимать таблетки за полчаса до или через пол часа после еды.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат предназначен для детей.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат предназначен для детей.

Препарат Иммунокинд содержит лактозу

Если ваш врач говорил, что у вашего ребенка непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это лекарственное средство.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИММУНОКИНД

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Дети в возрасте до 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в день.

Способ применения

Таблетки следует медленно рассасывать во рту. При необходимости, таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Если вы приняли препарата Иммунокинд больше, чем следовало

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

Если вы забыли принять препарат Иммунокинд

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Иммунокинд

Никаких вредных последствий не ожидается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно другим лекарственным препаратам Иммунокинд может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Побочные эффекты не известны.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

Если вы считаете, что у вашего ребенка возникли какие-либо побочные эффекты, поговорите с врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты, не указанные в этой инструкции.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИММУНОКИНД

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 таблетка Иммунокинд (100 мг) содержит:

Действующим(ими) веществом(ами) является(ются): Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20 мг, Calcium fluoratum trit. D6 20 мг, Calcium phosphoricum trit. D6 20 мг, Sulfur jodatum trit. D12 20 мг;

вспомогательным(и) веществом(ами) является(ются): целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, тальк.

Внешний вид Иммунокинд и содержимое упаковки

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

150 таблеток во флаконе. 1 флакон с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ.,

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7835 635530

ansgar.muhle@klein-naturarznei.de

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Telephone: +49 (0) 7243 200 49 10

ra.germany@alpenpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен