

Листок-вкладыш – информация для пациента

КИНДИНОРМ (KINDINORM®), гранулы, 20 г

Chamomilla dil. D12, Valeriana dil. D6, Kalium phosphoricum dil. D6, Staphisagria dil. D12

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Киндинорм, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Киндинорм.
3. Применение препарата Киндинорм.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Киндинорм.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КИНДИНОРМ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Киндинорм является гомеопатическим лекарственным средством для лечения поведенческих расстройств у детей и подростков с дефицитом внимания и концентрации, нервной возбудимостью, двигательной гиперактивностью, трудностями в обучении, нарушениями сна или состояниями общей слабости.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА КИНДИНОРМ

Не применяйте препарат Киндинорм:

- если у вас или у вашего ребенка повышенная чувствительность к действующим веществам;

- так как препарат Киндинорм содержит сахарозу, он противопоказан лицам с наследственной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы, дефицитом фермента сахаразы-изомальтазы.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с врачом:

- если улучшение не наступает в течение 8 недель,
- если возникают дополнительные жалобы.

Дети до 1 года

Киндинорм не следует применять детям в возрасте до 1 года из-за отсутствия данных о безопасности и эффективности препарата.

Другие препараты и препарат Киндинорм

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Рекомендуется проконсультироваться с врачом, если вы или ваш ребенок принимаете, недавно принимали или можете принимать любые другие лекарственные средства.

Киндинорм с пищей, напитками и алкоголем

На действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек, такие как курение и употребление алкоголя.

Беременность и грудное вскармливание

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением этого лекарственного средства.

Как и все фармацевтические препараты, Киндинорм следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КИНДИНОРМ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Дети в возрасте от 1 до 5 лет: 2 гранулы от 1 до 3 раз в день

Дети в возрасте от 6 до 11 лет: 3 гранулы от 1 до 3 раз в день

Подростки в возрасте 12 лет и старше: 5 гранул от 1 до 3 раз в день

Частота приемов должна быть уменьшена по мере уменьшения жалоб.

Способ применения

Гранулы следует медленно рассасывать во рту. Для маленьких детей гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.

Гранулы рекомендуется принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Если вы приняли препарата Киндинорм больше, чем следовало

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

Если вы забыли принять препарат Киндинорм

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Киндинорм

Никаких вредных последствий не ожидается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно другим лекарственным препаратам Киндинорм может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Побочные эффекты не известны.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

Если вы считаете, что у вас/вашего ребенка возникли какие-либо побочные эффекты, поговорите с врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты, не указанные в этой инструкции.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КИНДИНОРМ

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности после первого вскрытия флакона: 12 месяцев.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

В 10 г гранул (размер 5) содержится:

Действующим(ими) веществом(ами) является(ются): Chamomilla dil. D12 25 мг, Valeriana dil. D6 25 мг, Kalium phosphoricum dil. D6 25 мг, Staphisagria dil. D12 25 мг;

вспомогательным(и) веществом(ами) является(ются): сахароза.

Внешний вид Киндинорм и содержимое упаковки

Сферические гранулы белого или почти белого цвета.

20 г гранул во флаконе. 1 флакон с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ.,

Штайненфельд 3, 77736 Цельль ам Хармерсбах,

Германия

Telephone: +49 (0) 7835 635530

ansgar.muhle@klein-naturarznei.de

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3, 77736 Цельль ам Хармерсбах,

Германия

Telephone: +49 (0) 7243 200 49 10

ra.germany@alpenpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен