

ПРОСТАМЕД (PROSTAMED)

Листок-вкладыш. Информация для пациента.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к врачу или фармацевту.

Состав лекарственного средства:

активные вещества: порошок семян тыквы, обезжиренный – 200 мг; очищенный экстракт порошка семян тыквы, обезжиренных (5-10:1), экстрагент: натрия гидрокарбонат/поваренная соль/очищенная вода (3/6,1/90,9) – 100 мг; сухой экстракт золотарника (5-8:1), экстрагент: этанол 60 об.% – 2,6 мг; сухой экстракт из листьев осины (5-8:1), экстрагент: этанол 60 об.% – 6,3 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кальция гидрофосфат, порошок какао, сахароза, желатин, глицерин 85%, повидон K25, высокодисперсная двуокись кремния, тальк.

Форма выпуска

Жевательные таблетки.

Основные физико-химические свойства

Коричневые, круглые таблетки с выпуклой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Показания

Простамед традиционно применяется для облегчения симптомов, связанных с нижними мочевыводящими путями:

- при доброкачественном увеличении простаты (доброкачественной гиперплазии предстательной железы);
- при синдроме раздраженного мочевого пузыря (гиперактивность мочевого пузыря), после того, как врач исключил серьезные заболевания.

Препарат является традиционным лекарственным средством, которое зарегистрировано на основании многолетнего опыта применения по указанным показаниям.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам, растениям семейства Сложноцветных, салицилатам или к одному из вспомогательных веществ.

Заболевания, при которых рекомендуется уменьшить потребление жидкости, например, тяжелые заболевания сердца или почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие Простамеда с другими лекарственными средствами на данный момент не изучено.

Меры предосторожности

При длительных симптомах болезни или при появлении не указанных во вкладыше побочных эффектов, следует проконсультироваться у врача. Консультация у врача особенно необходима при появлении крови в моче, инфекции мочевыводящих путей, обострении расстройств или острой задержке мочеиспускания.

Относительно применения Простамеда детьми и молодыми людьми в возрасте до 18 лет нет достаточных клинических исследований. Поэтому Простамед не следует применять детям и молодым людям в возрасте до 18 лет.

Пациенты с такими редкими наследственными особенностями, как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность, непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или сахарозно-изомальтозная недостаточность, не должны принимать Простамед.

Беременность и кормление грудью

Безопасность в период беременности и кормления грудью не изучена. Поэтому употребление Простамеда не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

Следует отметить, что даже применение у женщин детородного возраста, которые не предохраняются, следует тщательно взвесить, поскольку нельзя исключить возможную беременность.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

Не влияет.

Режим дозирования и способ применения

Взрослым принимать по 2-4 таблетки 3 раза в день.

Таблетки следует разжевать, запивая достаточным количеством жидкости (около ¼ л питьевой воды).

Длительность применения препарата составляет 4 недели.

Побочные действия

В единичных случаях возможны расстройства желудка, тошнота, рвота и понос. Кроме того, могут возникать аллергические реакции, такие как сыпь, зуд, отек языка и слизистой оболочки полости рта и глотки. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Срок хранения после вскрытия 3 месяца.

Не применяйте Простамед после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Хранение

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и содержимое

По 60, 120, 200 таблеток помещают в пластиковые тубы. По 1 тубе пакуются вместе с листком-вкладышем в картонную коробку.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ,
Штайненфельд 3, 77736, Целль ам Хармерсбах, Германия.

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия.
Телефон: +49 (0) 7243 200 49 10
ra.germany@alpenpharma.com