

Листок-вкладыш – информация для пациента
СОЛИДАГОРЕН (SOLIDAGOREN), капли оральные

Жидкий экстракт (1:1,5-2,1) смеси травы золотарника (*Solidaginis herba*), травы лапчатки гусиной (*Anserinae herba*), травы хвоща (*Equiseti herba*) (4,2:1,4:1),
экстрагент: этанол 50 % (об/об)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Солидагорен, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Солидагорен.
3. Применение препарата Солидагорен.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Солидагорен.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СОЛИДАГОРЕН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Солидагорен – это традиционное растительное лекарственное средство, которое применяют в урологии:

- для промывания мочевыводящих путей и уменьшения отложений песка в почках, а также для поддерживающего лечения;
- в комплексном лечении при легких симптомах, связанных с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей.

Препарат является традиционным лекарственным средством, которое зарегистрировано на основании длительного опыта применения по указанным показаниям.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА СОЛИДАГОРЕН

Не применяйте препарат Солидагорен:

- если у вас повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата, аллергия на растения семейства Астровые (*Asteraceae*), поскольку растения указанного семейства используются при производстве растительного экстракта, который входит в состав препарата;
- в период беременности – из-за содержания в составе данного лекарственного средства экстракта травы хвоща применение Солидагорена в данный период противопоказано;
- при наличии заболеваний, при которых рекомендуется уменьшить потребление жидкости, например, тяжелые заболевания сердца или почек;
- для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста;
- у детей в возрасте до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Солидагорен проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Прием препарата должен сопровождаться обильным питьем не менее 2-х литров жидкости. При высокой температуре тела, затрудненном мочеиспускании, спазматических болях и при наличии крови в моче, или при сохранении симптоматики более 5 дней, следует немедленно обратиться к врачу.

Препарат содержит 45 % об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель.

Дети и подростки

Для применения у детей и подростков в возрасте 12 лет и старше.

Не рекомендуется применение детям до 12 лет из-за недостаточности данных о применении препарата.

Другие препараты и препарат Солидагорен

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов. Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность при беременности и в период лактации изучена недостаточно. Солидагорен не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

Следует отметить, что даже применение у женщин детородного возраста, которые не предохраняются, следует тщательно взвесить, поскольку нельзя исключать возможную беременность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не влияет при соблюдении рекомендованных доз.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СОЛИДАГОРЕН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Взрослые: 20-30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Применение у детей и подростков

Дети и подростки в возрасте 12 лет и старше: 20-30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Длительность применения: растительные препараты для промывания мочевыводящих путей традиционно применяются в течение периода от 2 до 4 недель.

Если вы приняли препарата Солидагорен больше, чем следовало

Если вы случайно приняли дозу препарата в два или три раза большую, чем рекомендуемая доза (что соответствует 40-90 каплям на разовый прием), обычно никаких вредных последствий не ожидается. В этом случае продолжайте прием, как описано в инструкции по дозировке.

Если вы приняли значительно большую дозу Солидагорена, чем следовало, нежелательные реакции могут усилиться (см. раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). В таком случае вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

Если вы забыли принять препарат Солидагорен

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно другим лекарственным препаратам Солидагорен может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Очень редко (<1/10000): реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

Частота неизвестна (не может быть оценено, исходя из имеющихся данных): легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СОЛИДАГОРЕН

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в защищённом от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

Срок годности – 3 года.

Срок хранения после вскрытия флакона – 3 месяца.

Не применяйте препарат после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Солидагорен содержит:

действующее вещество: 10 мл (= 9,5 г) капель содержат 7,9 мл жидкого экстракта (1:1,5-2,1) смеси травы золотарника (*Solidaginis herba*), травы лапчатки гусиной (*Anserinae herba*), травы хвоща (*Equiseti herba*) (4,2:1,4:1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);

вспомогательные вещества: вода очищенная, этанол 96 %.

Внешний вид Солидагорен и содержимое упаковки

Прозрачная жидкость коричневого цвета по 20 мл, 50 мл или 100 мл капель во флаконе с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону вместе с листком-вкладышем в картонной коробке.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Телефон: +49 (0) 7243 200 49 10

ra.germany@alpenpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен

04/2024