

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

## ТОНЗИЛОТРЕН (TONSILOTREN<sup>®</sup>)

**Торговое название**  
ТОНЗИЛОТРЕН (TONSILOTREN<sup>®</sup>)

**Лекарственная форма**

Таблетки

**Международное непатентованное название:** нет

**Состав**

1 таблетка (250 мг) содержит:

*действующие вещества:* Atropinum sulfuricum trit. D5 12,5 мг, Hepar sulfuris trit. D3 10,0 мг, Kalium bichromicum trit. D4 50,0 мг, Silicea trit. D2 5,0 мг, Mercurius bijodatus trit. D8 25,0 мг;

*вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.

**Описание**

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое лекарственное средство.

**Фармакологические свойства**

Гомеопатическая терапия явно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют защитные силы самого организма и активируют таким образом его потенциал самоизлечения. Ответ организма на гомеопатическое средство строго индивидуален. По этой причине дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

**Показания к применению**

Острый тонзиллит, хронический или рецидивирующий острый тонзиллит и увеличение миндалин. Для ускорения заживления после хирургического удаления миндалин.

**Противопоказания**

Препарат не следует применять при известной гиперчувствительности к хрому, ртути, любым другим активным веществам или любому из вспомогательных веществ.

Противопоказан детям до 6 лет.

**Особые указания и меры предосторожности**

Если Ваш врач говорил Вам, что у Вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать Тонзилотрен.

Препарат содержит лактозу и сахарозу. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции

глюкозы-галактозы не должны принимать этот лекарственный препарат. Также пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы или сахарозо-изомальтазной недостаточности не следует принимать этот лекарственный препарат.

Проконсультируйтесь с Вашим врачом в случае:

- если симптомы острого состояния не улучшаются или ухудшаются после первых 2 дней лечения;
- если возникают дополнительные жалобы, например, температура тела выше 39 °C.

Пациентам, страдающим заболеваниями щитовидной железы, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Тонзилотрен.

#### **Применение во время беременности и в период кормления грудью**

Принимать Тонзилотрен во время беременности или в период кормления грудью можно только после предварительной консультации с врачом.

Как и все лекарственные препараты, Тонзилотрен следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами**

Не влияет.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом, если они принимают, недавно принимали или могут принимать любые другие лекарственные средства.

**Примечание:** на действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

#### **Режим дозирования и способ применения**

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

#### **Режим дозирования**

**Взрослые:** при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимают по 1–2 таблетки 3 раза в день.

#### **Педиатрическая группа**

**Дети с 6 до 12 лет:** при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждые 2 часа, но не более 6 таблеток в день, до улучшения симптомов. При *последующем лечении* или при *хронических состояниях*, принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

**Дети с 12 лет и старше:** при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимают по 1–2 таблетки 3 раза в день.

При *увеличении миндалин* взрослые и дети принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуется продолжать лечение в течение 6–8 недель. При хронических и рецидивирующих острых состояниях следует применять несколько циклов лечения в год продолжительностью 6–8 недель каждый.

#### **Способ применения**

Таблетки должны медленно растворяться во рту.

Для маленьких детей таблетки можно измельчить, а затем растворить в небольшом количестве воды.

Следует соблюдать интервал не менее получаса до приема пищи.

#### **Побочные реакции**

В очень редких случаях (< 1/10000) или неизвестных (частота не может быть оценена по имеющимся данным): могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, например, сыпь на коже. В таких случаях следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При усилении слюноотделения рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.

*Примечание:* существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

#### **Передозировка**

Зарегистрированных случаев передозировки нет.

#### **Упаковка**

По 20 таблеток в блистере из ПВХ и алюминиевой фольги. По 2 блистера с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска**

Без рецепта.

#### **Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ и Ко. КГ.,  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия

#### **Владелец торговой лицензии**

Альпен Фарма ГмбХ  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия